


علائم خطر:

تب و لرز شدید
سوزش ادرار بسیار شدید
احتباس ادرار یا عدم توانایی در ادرار
کردن
خونریزی شدید به همراه لخته در
ادرار
درد شدید پهلوها

در صورت بروز هر یک از علائم
فوق با مرکز ارودینامیک تماس
گرفته و یا در صورت عدم دسترسی
به اورژانس بیمارستان پارسیان
مراجعه نمایید.




مراجعه کننده محترم شما تحت
بررسی ارودینامیک یا نوار مثانه قرار
گرفته اید.

در این تست برای شما سوند باریک
قرار داده شده است و تغییرات فشار
مثانه چک شده است طی روزهای
آتی ممکن است از سوزش ادرار، تکرر
ادرار، رویت مقداری خون داخل
ادرار، سخت ادرار کردن و کاهش فشار
ادرار رنج ببرید که بامصرف دارو به
تدریج برطرف خواهد شد.

آیا لازم است پس از انجام تست داروی خاصی مصرف نمایم؟

پس از انجام تست ارودینامیک بامشورت
پزشک خود قرص سیپروفلوکساسین
۵۰۰هر ۱۲ساعت یک عدد مصرف
نمایید. در مواردی که نارسایی کلیه وجود
دارد بهتر است قرص سفکسیم ۴۰۰، روزانه
یک عدد مصرف شود. اطفالی که تحت
تست یورودینامیک قرار میگیرند طی
مشورت با پزشک معالج اقدام به مصرف
دارو نمایند. در صورت وجود سوزش ادرار
میتوانید از قرص فنازوپیریدین ۱۰۰ به
صورت یک عدد هر ۸ساعت به مدت
۷۲ساعت استفاده نمایید

تست نوار مثانه



بیمارستان پارسیان شهرکرد

۰۳۸-۳۱۵۰

شهرکرد-جاده دانشگاه آزاد-منظریه

Parsianhospital-shk.ir

info@parsianhospital-shk.ir

بیماران ضایعه ی نخاعی، بخصوص ضایعات نخاع گردنی، در صورتیکه پس از انجام تست یورودینامیک دچار سردرد شدید، تعریق و گرگرفتگی و یا سیخ شدن موهای بدن شدید، بلافاصله فشار خون را چک کرده و به مرکز ارودینامیک مراجعه نمایید و یا به نزدیک ترین اورژانس مراجعه کنید تاکید میگردد چک فشار خون در این شرایط بسیار اهمیت دارد

پس از انجام نوار مثانه دوش بگیرید و تا چندین روز آب و مایعات فراوان بنوشید

جواب تست شما به مدت یک یا دوهفته دیگر آماده خواهد شدو پس از آماده شدن تست همکاران پذیرش با شما تماس خواهند گرفت. خواهشمند است در گرفتن جواب تعجیل نفرمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل بعد از انجام تست و پیگیری جواب با شماره تلفن

۰۳۸۳۱۵۰ داخلی ۲۵۰ یا داخلی ۳۵۰ تماس حاصل

فرمایید

اگر بواسطه ی دیابت، فشارخون ومشکلات قلبی و یا مشکلات تیروئید و... هرگونه دارویی مصرف میکنید از همان روز انجام تست ارودینامیک میتوانید مصرف آنها را ادامه دهید و هیچ گونه قطع دارویی لازم نمی باشد، به خصوص تاکید می گردد مصرف آسپرین، پلاویکس، وارفارین، و آکسپین و سایر رقیق کننده های خون ادامه یابند.

اگر دریچه مصنوعی قلب، پروتزهای مفاصل و یا هرگونه پروتز دیگر در بدن شما وجود دارد حتما مسئول مرکز را مطلع کنید. وجود استنت های قلبی منعی جهت انجام تست یورودینامیک نمی باشد