

فاویسم چیست؟



فاویسم یک بیماری ارثی خونی می باشد که به علت کمبود یکی از آنزیم های گلبول قرمز ایجاد می شود. این بیماری وابسته به جنس بوده و بیشتر در جنس مذکر دیده می شود.

چگونه علائم بیماری بروز می کند؟

بیماران در حالت عادی کاملا طبیعی بوده و هیچ گونه علامتی ندارند مگر با مواد خوراکی مانند باقالا یا داروها و مواد ممنوعه یا عفونت ها مواجه شوند که در اینصورت دچار علائم حاد بیماری می شوند.

آیا دختران نیز به این بیماری مبتلا می شوند؟

در جنس مذکر بیشتر دیده می شود و اکثر افراد مونث دارای نقص آنزیمی بدون علامت هستند ولی بیماری به صورت علامت دار در دختران خصوصا در کشور ما نیز به وفور دیده می شوند لذا بررسی جنس مونث و اقدامات پیشگیرانه در این جنس نیز توصیه اکید می شود.

در چه سنینی فاویسم بیشتر شیوع دارد؟

سن شیوع این بیماری هم یک تا ۱۰ سالگی است، اما بیشتر مبتلایان در رده سنی زیر ۵ سال قرار دارند.

علائم فاویسم کدامند؟

۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از خوردن مواد اکسیدان (موادی که اکسیژن در آنها زیاد تولید می شود. همین امر باعث می شود که گلبول های قرمز از بین بروند یا پاره شوند).

فرد به طور ناگهانی دچار علائمی از قبیل:

- تب خفیف

- بی حالی، رنگ پریدگی، زردی

- حالت تهوع و گاهی استفراغ

- قرمز یا تیره رنگ شدن ادرار

(به رنگ چای پررنگ)

- گاهی درد شکم یا کمر



در صورت عدم درمان مناسب، احتمال آسیب دیدن

کلیه ها و ایجاد نارسایی کلیوی، نارسایی قلبی و نیز کم

خونی شدید و صدمات حاصل از آن وجود دارد.

درمان فاویسم چیست؟

این بیماری درمان قطعی ندارد و تنها اقدام موثر پیشگیری از بروز حمله همولیز با پرهیز از مواجهه با موادی که سبب بروز حمله می شوند، می باشد.



در صورت بروز حمله سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنید تا

اقدامات درمانی و حمایتی انجام شود.

معمولا درمان با تجویز سرم به مقدار کافی و در صورت نیاز به تزریق خون بر حسب نظر پزشک صورت می گیرد.

در صورتی که یک نفر در خانواده یا بستگان نزدیک، به بیماری مبتلا باشند، آیا لازم است بقیه افراد از جهت بیماری بررسی شوند؟

در صورت وجود یک فرد مبتلا در خانواده، بررسی برای همه افراد خانواده، خصوصا فرزندان دیگر (اعم از پسر و دختر) لازم است. همچنین توصیه می شود سایر افراد مذکر بستگان نزدیک شامل (پسرخاله، پسر دایی، پسر عمو و پسر عمه) نیز بررسی شوند.

برای پیشگیری از حمله بیماری، چه اقدامی باید انجام داد؟

باید بیمار از مواجهه با مواد اکسیدان پرهیز نماید. این مسئله شامل همه بیماران با هر شدت بیماری می باشد.

در صورت شک به بیماری نیز تا تکمیل بررسی باید فرد از مواجهه با اینگونه مواد پرهیز نماید.

توجه: فاویسم با آلرژی تفاوت دارد. یعنی کسانی که فاویسمی هستند، فکر نکنند که در مقابل غذاهای دیگر هم حساسند یا آلرژی دارند.

فاویسم (بیماری باقلا)



بیمارستان پارسیان شهرکرد

۰۳۸-۳۱۵۰

شهرکرد-جاده دانشگاه آزاد-منظریه

Parsianhospital-shk.ir

info@parsianhospital-shk.ir

اقداماتی که والدین کودک مبتلا به فاویسم باید توجه

نمایند:

- از مصرف هر نوع باقلا، عبور از مزارع باقلا و از آوردن باقلا به منزل، تماس با داروها و مواد ممنوع پرهیز شود.
- برای تسکین درد یا پایین آوردن تب کودک، هرگز به او آسپرین ندهید. از استامینوفن فقط با مقداری که پزشک تجویز کرده است بهره بگیرید.
- در صورت مراجعه به پزشک و یا مراکز درمانی، ابتلا به فاویسم را اعلام کنید تا داروهای بی خطر برای فرزندان تجویز شود.
- اگر مادری هستید که به کودک، شیر می دهید، هرگز باقلا و آسپرین نخورید و در مورد مصرف سایر داروها نیز با پزشک مشورت کنید.



توجه: در نوزادان و کودکان زیر یک سال نیز ممکن است بیماری از طریق خوردن شیر مادر که باقلا یا مواد و داروهای ممنوعه مصرف نموده باشد اتفاق بیفتد.

لیست برخی مواد ممنوعه در بیمار مبتلا به فاویسم:

- باقلا
 - سولفونامیدها: کوتریموکسازول، نالیدیکسیک اسید، سولفاستامید، سولفاپریدین، سولفاتیلامید، سولفادیازین
 - داروهای ضد مالاریا: کلروکین، کینین
 - داروهای متفرقه: آسپرین، استیل سالیسیلیک اسید، متیلن بلو، فنیل هیدرازین، پروبنسید
 - مواد متفرقه: حنا، نفتالین
- (استامینوفن با احتیاط مصرف شود)

