

جراحی آپاندیس



بیمارستان پارسیان شهرکرد

۰۳۸-۳۱۵۰

شهرکرد-جاده دانشگاه آزاد-منظریه

Parsianhospital-shk.ir

info@parsianhospital-shk.ir

در صورت علائم زیر به پزشک اطلاع دهید:

۱. حساسیت در لمس شکم و سفتی شکم

۲. تب، لرز و عرق

۳. بی اشتهائی

۴. استفراغ و اسهال

۵. نفخ شکم و یبوست

۷. در روزهای اول پس از عمل از مصرف موادغذایی نفخ (ذرت، کلم، لوبیا، نخود، نوشابه های گازدار) اجتناب شود.


۸. از مواد غذایی پر پروتئین و ویتامین C استفاده شود مثل تخم مرغ، لبنیات، مرکبات، آناناس و...

۹. محل جراحی طبق دستور پزشک پانسمان شود.

۱۰. دستور دارویی به موقع و طبق دستور پزشک مصرف شود.

آپاندیس زائده کوچک و شبیه انگشت با طول حدود ۲ تا ۲۵ سانتی متر است که در ربع تحتانی راست شکم است. ممکن است در اثر پیچ خوردگی یا انسداد ناشی از یک توده سفت شده از مدفوع ، تومور یا جسم خارجی دچار التهاب یا توده شود.

التهاب باعث **افزایش فشار** داخل مجرا می شود. در نتیجه دردی شدید و پیش رونده در کل شکم یا قسمت راست ایجاد می شود.



علائم

بیمار می تواند چند مورد از علائم زیر یا همه را داشته باشند:

۱. درد شکم


۲. تب

۳. تهوع و گاهی استفراغ

۴. یبوست

۵. کاهش اشتها

۶. حساسیت در لمس دور ناف



آموزش های بعد از عمل جراحی:

۱. در صورت درد از داروهای مسکن تجویز شده استفاده شود.

۲. بخیه ها بین ۵ تا ۷ روز بعد از عمل کشیده میشود.

۳. از انجام فعالیت های بدنی سخت و بلند کردن اجسام سنگین تا ۴ هفته پس از عمل اجتناب شود.

۴. از حمام در وان پرهیز شود ولی دوش گرفتن از ۴۸ ساعت بعد عمل مشکل ندارد.

۵. چند ساعت بعد از عمل شروع به راه رفتن کنید. بهتر است راه رفتن در سطح صاف باشد.

۶. چند ساعت بعد از عمل طبق دستور پزشک رژیم مایعات شروع می شود.