

کوله سیستیت التهاب

کیسه صفرا است که بیشتر به علت

سنگ های صفراوی ایجاد می شود.

کوله سیستکتومی به عمل برداشتن کیسه

صفرا از طریق جراحی شکم و یا از طریق

لاپاراسکوپی گفته می شود.

علائم بالینی:

۱.درد شکم

۲.زردی پوست

۳.خارش پوست

راه های تشخیصی:

۱.معاینه متخصص جراحی

۲.سونوگرافی

۳.آزمایشات کبدی

۴.سی تی اسکن یا ام آر آی

درمان :

۱.درمان طبی(تغذیه ای -دارویی)

۲.درمان جراحی



مراقبت های بعد از عمل جراحی:

۱.به مدت ۴ تا ۶ هفته رژیم کم چرب داشته باشید.

۲.از بلند کردن اجسام سنگین تا ۶ هفته بعد از عمل اجتناب کنید.

۳. راه بروید و سرفه کنید.

۴.از روز دوم بعد از عمل میتوانید حمام کنید.

۵. پس از استحمام نیازی به پانسمان نبوده و روی زخم میتواند باز باشد .

۶.در مورد شروع فعالیت جنسی با پزشک معالج مشورت کنید.

۷.مراجعه به پزشک ۷ تا ۱۰ روز بعد از ترخیص باشد.

۸.در صورت سرفه با دست روی محل عمل را نگه دارید.

۹. داروها را طبق دستور پزشک مصرف کنید.

جراحی کیسه صفرا



بیمارستان پارسیان شهرکرد

۰۳۸-۳۱۵۰

شهرکرد-جاده دانشگاه آزاد-منظریه

Parsianhospital-shk.ir

info@parsianhospital-shk.ir

خودمراقبتی هسته اصلی سلامت

ورفاه است.

باخودمراقبتی میتوانیم فردی مولد

عشق، آرامش، آسایش، امنیت و رفاه

علائم هشدار دهنده:

در صورت وجود علائم زیر فوراً به پزشک معالج اطلاع داده و به مرکز درمانی مراجعه کنید:

۱. تب و لرز
۲. درد شدید
۳. تهوع و استفراغ
۴. بی اشتها
۵. ترشح یا خونریزی از زخم
۶. زردی
۷. خارش پوست
۸. تغییر رنگ ادرار و مدفوع