

ختنه چیست؟

ختنه شایع ترین عمل جراحی است که روی نوزادان پسر انجام می شود. در ختنه پوست کلاهک آلت برداشته می شود. ختنه عموماً به روش حلقه و جراحی انجام می پذیرد.



مراقبت قبل از عمل

- از ساعت ۵ صبح روز عمل کودک باید ناشتا باشد.
- قبل از جراحی کودک را حمام کنید.


مراقبت پس از انجام ختنه

- در ۲۴ ساعت اول از شستشوی محل ختنه پرهیز کنید و چنانچه کودک اجابت مزاج داشت با دستمال مرطوب یا پنبه محل الوده را تمییز نمایید.
- بعد از ۲۴ ساعت شستن و حمام کردن کودک مانعی ندارد.
- روزی ۳ بار به مدت ۴ روز محل ختنه را با پماد تجویز شده توسط پزشک اغشته کنید.
- برای جلوگیری از فشار به محل ختنه، از پوشاندن شلوار و لباس تنگ به کودک تا زمان افتادن حلقه خودداری کنید و از پوشک با سایز بزرگتر استفاده کنید.
- در مواقعی که کودک خود را در اغوش می گیرید سعی کنید به محل ختنه فشار وارد نکنید.

- در ۱۲ ساعت اول برای کاهش درد و بی قراری کودک از قطره استامینوفن به میزان ۲ برابر وزن کودک هر ۴ ساعت استفاده کنید. (حتماً در مورد مصرف این دارو از پزشک اجازه بگیرید)
- در صورتی که از داروی دل درد برای کودکان استفاده می کنید در شب اول طبق نظر پزشک آن را مصرف کنید و در صورت لزوم تکرار کنید.
- در همان ساعات اولیه تا ۳ مرتبه به کودک آب قند بدهید.
- حدود ۲۴ ساعت پس از ختنه در قسمت بعد از حلقه تورم و التهاب ایجاد می گردد که در صورت تورم شدید و غیر طبیعی به پزشک مراجعه کنید.
- حلقه تا روز دهم می افتد چنانچه با مشکلی مواجه شدید، مراجعه کنید.
- یک هفته پس از ترخیص جهت بررسی مجدد و معاینه به پزشک مراجعه کنید.
- در زمان جدا شدن حلقه ممکن است مختصری خونریزی اتفاق افتد که طبیعی است.
- تا ماهها بعد از ختنه بهتر است از پوشک و شلوار گشادتر استفاده کنید و محل مجرای ادراری را با وازلین چرب کنید.



ختنه



بیمارستان پارسیان شهرکرد

۰۳۸-۳۱۵۰

شهرکرد-جاده دانشگاه آزاد-منظریه

Parsianhospital-shk.ir

info@parsianhospital-shk.ir

منبع:

<http://www.nursingconsult.com>



مادر عزیز این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شما است. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن شاهد بهبودی کودکتان باشیم.

در صورت مشاهده موارد زیر باید با پزشک

خود تماس بگیرید:

- خونریزی مداوم
- افزایش قرمزی و یا عدم برطرف شدن آن ۳ تا ۵ روز پس از ختنه
- تب
- تشدید ترشح و تورم، ترشح بدبو، تاول چرکی
- ناتوانی در ادرار کردن در ۶-۸ ساعت اول پس از ختنه
- در صورتی که حلقه ختنه تا ۱۰-۱۲ روز پس از عمل نیافتد
- کل آلت قرمز و متورم باشد
- عدم پاسخ به مسکن و بی قراری شدید، گریه شدید و امتناع از غذا خوردن