


جراحی برداشتن بیضه یا ارکیکنومی

مراقبت از زخم جراحی:

عدم نزول بیضه عبارت است از یک اختلال موجود در هنگام تولد که در آن یک یا هر دو بیضه از لگن به مکان طبیعی خود در بیضه دان نزول نکرده اند. ۳٪ از نوزادان پسر رسیده و ۳۰٪ از نوزادان پسر نارس دچار عدم نزول بیضه هستند، اکثرا بدون درمان تا یکسالگی نزول می کنند.



- بهتر است بیمار ۱-۲ هفته اول پس از عمل را بیشتر استراحت کرده و موارد زیر را رعایت نماید.- از فعالیت بدنی شدید، ورزش (دویدن، نشست و برخاست و...) اجتناب گردد.

- می توانید پیاده روی نماید.

- بالا و پایین رفتن از پله محدود باشد.

- بهتر است بیضه ها آویزان نباشند و درموقع پیاده روی (اگر پزشک معالج صلاح بداند) از بیضه بند استفاده شود .

- بهتر است هنگام استراحت یا خواب، با قرار دادن حوله ای زیر بیضه ها ، آن ها را بالاتر نگه دارید.

- از نشستن طولانی مدت روی صندلی های سفت خودداری کنید و صندلی نرم استفاده نمایید.

- مراقب باشید بیضه ها توسط باسن یا پاها تحت فشار قرار نگیرند.

-رابطه ی زناشویی را به ۲-۱ هفته بعد موکول نمایید.


رانندگی:

پس از گذشت ۱۰-۷ روز از عمل جراحی، در صورت نداشتن درد و ناراحتی در ناحیه ی عمل، رانندگی اشکال نخواهد داشت.

رژیم غذایی:

می توانید رژیم غذایی عادی را از سر بگیرید

- برای جلوگیری از فشار و خونریزی محل عمل، از یبوست پیشگیری کنید.



۳

Parsianhospital-shk.ir
info@parsianhospital-shk.ir

دارو:

دارو ی تجویز شده را طبق دستور داده شده مصرف نمایید .

-آنتی بیوتیک تجویزی را پس از غذا و با یک لیوان آب میل کنید .

-از مصرف خودسرانه سایر مسکن ها و یا تجدید نسخه خودداری نمایید .

-در صورت بروز هرگونه مشکل یا حساسیت دارویی جهت تغییر دارو با پزشک معالج تماس بگیرید.

۴

بیمارستان پارسیان شهرکرد
۰۳۸-۳۱۵۰
شهرکرد-جاده دانشگاه آزاد-منظریه