




- استرس
- استعمال دخانیات
- سوء تغذیه

عوارض احتمالی

- عفونت رحم با علائم تب، لرز و درد
- سقط ناقص، که در آن قسمتی از جفت یا بافت های جنین در رحم باقی مانده یا فراموش شده است.

تشخیص و درمان

- پزشک پس از شرح حال و معاینه ممکن است برای تشخیص، سونوگرافی و آزمایش های خون توصیه نماید.
- ♦ در مورد تهدید به سقط، دستورات پزشک را دنبال کنید.
- استراحت در بستر اغلب برای پایدار نگه داشتن بارداری



۲

بیمارستان پارسیان شهرکرد

۰۳۸-۳۱۵۰

شهرکرد-جاده دانشگاه آزاد-منظریه

کد : TE_PA_46

سقط و کورتاژ

- ♦ شرح بیماری
- سقط: ختم زودرس بارداری (قبل از هفته بیستم حاملگی)
- ♦ علائم شایع
- انقباضات رحمی
- خونریزی مهبلی خفیف تا شدید
- ♦ علل شایع
- اختلالات رحمی که مانع رشد طبیعی تخم بارور شده در رحم می گردند.
- اختلالات رحمی که باعث جدا شدگی جنین و جفت از رحم می گردند.
- عفونت ها، به خصوص عفونت های ویروسی مانند سرخچه یا آنفولانزا
- عوامل شایعه افزایش دهنده خطر عبارتند از:
- سابقه طبی بیماری هایی مانند دیابت شیرین، کم کاری تیروئید و فشار خون بالا

۱

Parsianhospital-shk.ir

info@parsianhospital-shk.ir



فعالیت

- با پزشک مشورت کنید.
- از بلند کردن اجسام سنگین و ایستادن طولانی مدت تا مدت ۶ هفته بعد از عمل خودداری کنید.

رژیم غذایی

از مصرف غذاهای نفاخ اجتناب کنید و جهت جلوگیری از یبوست رژیم غذایی پر فیبر شامل میوه و سبزیجات و مایعات فراوان مصرف کنید.


در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه شود؟

- تا دو هفته بعد از عمل باید تحت نظر باشید و در صورت بروز عوارض احتمالی مانند تب، لرز، خونریزی شدید و درد به پزشک مراجعه کنید.
- از روشهای پیشگیری از بارداری استفاده کنید.
- داروها را طبق دستور استفاده کنید.

کافی خواهد بود. در صورت خونریزی شدید بستری در بیمارستان لازم است.

- اگر نتوان با مراقبت ها از سقط جلوگیری کرد، پزشک نسبت به مداخلات جراحی اقدام می کند.
- کورتاژ: تخلیه و خروج محصولات حاملگی از رحم در اتاق عمل تحت بیهوشی را کورتاژ گویند.

داروها



- مسکن جهت تسکین درد
- آنتی بیوتیک برای مقابله با عفونت
- تزریق خون برای موارد خونریزی شدید
- برای خانمهای دارای گروه خونی RH منفی ممکن است روگام تجویز شود