


## حاملگی خارج از رحم



بیمارستان پارسیان شهرکرد

۰۳۸-۳۱۵۰

شهرکرد-جاده دانشگاه آزاد-منظریه

Parsianhospital-shk.ir

info@parsianhospital-shk.ir

## باسلام خدمت شما بیمار گرامی

رحم عضوی است عضلانی و گلابی شکل که در داخل شکم جای دارد و از طریق دولوله بنام لوله های فالوب با تخمدان ها در ارتباط است. تخمدان ها هم دو عضو بادامی شکل هستند که وظیفه تولید تخمک و هورمونهای جنسی زنانه را بر عهده دارند.

حاملگی نتیجه لقاح تخمک و اسپرم است. لقاح در مراحل ابتدایی خود در لوله های رحمی اتفاق می افتد. با لقاح اسپرم و تخمک سلول تخم تشکیل می شود. سلول تخم در اثر حرکت مژک های داخل لوله های رحمی به سمت داخل حفره رحم رانده شده و در آنجا لانه گزینی کرده و به رشد خود ادامه می دهد.

اگر به هر دلیلی سلول تخم در لوله های رحمی باقی بماند و به سمت داخل رحم حرکت نکند حاملگی خارج رحمی ایجاد می شود.

## علل حاملگی خارج رحمی:

عوامل متعددی در ایجاد حاملگی خارج رحمی نقش دارند که مهمترین آن ها شامل:

• التهاب و عفونت های لوله های رحمی در اثر سقط، تب تفاس و... که باعث چسبندگی های اطراف لوله می شوند.

• تغییر شکل های غیر طبیعی لوله ها که در بعضی افراد مادرزادی هستند.

• سابقه حاملگی خارج رحمی در بارداری قبلی  
• استفاده از قرصهای پیشگیری که دارای پروژسترون هستند.

• استفاده از آی-یو-دی

• استفاده از روشهای کمک باروری

• به صورت خود به خودی نیز گاهی اتفاق می افتد.



### علائم:

- درد و حساسیت شکم بخصوص در نواحی اطراف تخمدانها (دردو طرف لگن یا یک طرف آن)
- وجود یک توده غیرعادی درنواحی اطراف تخمدان که در سونوگرافی قابل مشاهده است.
- قاعدگی نامنظم و غیر عادی همراه با مثبت شدن تست بارداری

### تشخیص:

- تشخیص از طریق علایم و نشانه ها، آزمایش بارداری مثبت و سونوگرافی در فاصله های زمانی مشخص معمولاً بلافاصله ۴۸ ساعت گاهی برای تشخیص قطعی لازم است تا چند روز بیمار تحت نظر بوده و آزمایش بارداری و سونوگرافی در فواصل زمانی مشخص (هر ۴۸ ساعت) تکرار گردد.

### بارداری خارج از رحم



۴

پس از تایید تشخیص و با توجه به سن حاملگی و حجم محصولات حاملگی درمان مناسب جهت بیمار در نظر گرفته شود.

### درمان دارویی:

در صورتی که سن حاملگی کم باشد (۶-۸ هفته) و حجم محصولات حاملگی کمتر از ۳-۲/۵ سانتی متر باشد از داروی متونروکسات (ام-تی -ایکس) جهت درمان استفاده می شود.

درمان جراحی در شرایط که سن بارداری بیشتر از ۶ هفته باشد یا بیمار دچار خونریزی داخل شکمی باشد یا درمان دارویی ممنوع بوده و یا موثر نباشد از روشهای جراحی استفاده می شود. در روش جراحی معمولاً لوله رحمی سمت مبتلا برداشته می شود.

### مراقبت بعد از عمل:

پس از عمل بیمار حدود ۸-۲۴ ساعت با نظر پزشک ناشتا مانده و طی این مدت سرم و داروهای آنتی بیوتیک دریافت می کند. سوند ادراری هم به بیمار وصل می باشد.

۵

پس از این مدت سوند و سرم قطع شده، ابتدا رژیم مایعات در حد تحمل داده می شود و در صورت عدم سرگیجه و مشکل به تدریج با کمک از بستر خارج می شود. مصرف مایعات کافی و رعایت بهداشت فردی ضروری است.

### مراقبت پس از ترخیص:

- روز ۸-۱۰ پس از عمل جهت کشیدن بخیه ها به بیمارستان یا مطب پزشک معالج مراجعه کنید.
- پیشگیری از بارداری تا زمانی که پزشک معالج صلاح بداند، داشته باشید.
- در صورت درمان دارویی: کنترل سطح هورمون بارداری (بتا) بصورت هفتگی در ماه اول تا زمانی که سطح آن به زمان قبل از بارداری برسد و پس از طبیعی شدن ماهیانه یکبار تا سه مورد آزمایش طبیعی داشته باشد.

۶